



Obveščamo vas, da se je v vrtcu pojavil

## RESPIRATORNI SINCICIJSKI VIRUS (RSV)

*Prosimo vas, da ste pozorni na otrokovo zdravstveno stanje in se držite priporočil za zamejitev širjenja bolezni. Morebitna opažanja v zvezi z obolenjem pravočasno sporočite vzgojiteljicam skupine, ki jo obiskuje vaš otrok.*

**Opis bolezni:** RSV je kratica za respiratorni sincicijski virus. Je zelo pogost povzročitelj okužb dihal pri dojenčkih in otrocih v zgodnjem otroštvu. Nevarnost, da se razvije težja oblika okužbe z RSV, je še posebej prisotna pri prezgodaj rojenih otrocih, otrocih s kronično pljučno boleznijo in otrocih s hujšo prirojeno srčno napako. Okužbe z RSV se v državah z zmernim podnebjem najpogosteje pojavljajo od jeseni do pomladi.

**Bolezniški znaki:** znaki okužbe z RSV se lahko sprva kažejo kot prehlad in lahko vključujejo: zvišano telesno temperaturo, voden izcedek iz nosu, druge znake prehlada. **Znaki se lahko poslabšajo, ko se virus razširi v pljuča, in se kažejo kot:** suh, dražeč kašelj, težko dihanje, sopenje ali piskajoče dihanje, hitro dihanje, pomodrevanje, daljši dihalni premori.

**Širjenje bolezni:** virus je zelo nalezljiv. Virus se širi s telesnim stikom (z dotikom, s poljubljanjem, z rokovanjem) z okuženo osebo. Klice se širijo tudi po zraku pri kašljanju ali kihanju. Poleg tega lahko virus RSV preživi več ur - na pulstu v trgovini ali na uporabljenem robčku.

**Zdravljenje:** po navodilu izbranega pediatra.

**Vir:** <https://www.nijz.si/sl/respiratorni-sincicijski-virus-rsv>