



Obveščamo vas, da se je v vrtcu pojavila

ŠESTA OTROŠKA BOLEZEN

Prosimo vas, da ste pozorni na otrokovo zdravstveno stanje in se držite priporočil za zamejitev širjenja bolezni. Morebitna opažanja v zvezi z obolenjem pravočasno sporočite vzgojiteljicam skupine, ki jo obiskuje vaš otrok.

Za bolezen je značilna povišana telesna temperatura, tudi preko 40°C, ki ji potem, ko vročina izzveni, sledi značilen izpuščaj. Otroci obolevajo preko celega leta, večinoma spomladi in jeseni.

Doba inkubacije

Obdobje inkubacije traja devet dni. .

Način prenosa

Virus se prenaša s slino, kašljem, izcedkom iz nosu.

Znaki bolezni

Prvi simptom, ki ga opazite pri otroku, je nenadna visoka telesna temperatura, tudi do 40 stopinj Celzija.

Povišana telesna temperatura traja od tri do štiri dni, potem pa se pojavi rdeč izpuščaj na vratu in trupu, širi se na obraz, roke in noge. Traja lahko nekaj dni ali več tednov.

Dodatni simptomi so: otečene bezgavke, izcedek iz nosu, kašelj, bruhanje, driska, bolečine v ušesih.

Zdravljenje

Zdravljenje je podporno oz. simptomatsko. Vročino znižujemo z zdravili za zdravljenje povišane telesne temperature. V primeru driske in bruhanja skrbimo za ustrezno nadomeščanje tekočine. Izpuščaj izzveni brez zdravljenja.

Priporočila

V primeru, da bolezen povzroča humani herpesvirus 6 ni poznanih preventivnih ukrepov. Kadar pa bolezen povzročajo drugi virusi (našteti zgoraj), ki se prenašajo z izločki dihal ali po fekalno-oralni poti, je učinkovit preventivni ukrep higiena oz. umivanje rok. Otrok potrebuje v fazi vročine domačo nego, v fazi izpuščaja in s tem potrjene šeste otroške bolezni pa se lahko vključi v vrtec, ker ni kužen oz. nalezljiv.

Vir: https://www.zd-lj.si/zdlj/images/OBV_252_%C5%A0esta_otro%C5%A1ka_bolezen.pdf